

Taulumenetelmä modaalilogiikalle

- On vaikeaa löytää Hilbert-tyylisiä todistuksia:
Käytössä Modus Ponens -sääntö: jotta voidaan johtaa Q , täytyy johtaa P ja $P \rightarrow Q$. Mutta mikä on sopiva P ?
Esim. $\{A \rightarrow B, A \rightarrow C\} \models A \rightarrow (B \wedge C)$
 1. $A \rightarrow B$
 2. $A \rightarrow C$
 - ...
 - n . $(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow (B \wedge C)))$
- Alikaavaperiaate: lauseen Q todistuksessa tarvitaan vain Q :n alikaavoja.
 \Rightarrow resoluutio, sekventtikalkyyli, taulumenetelmä.

Taulusäännöt

Modaalilogiikan taulumenetelmä koostuu lauselogiikan säännöistä ja modaalisäännöistä.

- Lauselogiikan säännöt (prefiksoiduille lauseille):

$$\frac{\sigma \neg \neg P}{\sigma P} \qquad \frac{\sigma \alpha}{\sigma \alpha_1} \qquad \frac{\sigma \beta}{\sigma \beta_1 \mid \sigma \beta_2}$$

$$\sigma \alpha_2$$

Huom! Prefiksi ei muutu.

Taulumenetelmä modaalilogiikalle K

- Otetaan käyttöön prefiksit, joiden ideana on antaa nimiä mahdollisille maailmoille siten, että nimistä voidaan nähdä, voidaanko nimetyistä maailmasta saavuttaa toinen nimetty maailma.
- **Prefiksi** on ei-tyhjä äärellinen jono luonnollisia lukuja. Esim. $\langle 1 \rangle$ ja $\langle 11, 1, 1, 1, 111, 2 \rangle$ ovat prefiksejä.
- **Prefiksoitu lause** on muotoa σP , missä σ on prefiksi ja P lause. (Idea: P on tosi maailmassa nimeltä σ .) Esim. $\langle 1 \rangle (P \vee \neg P)$ ja $\langle 11, 1, 1, 111, 2 \rangle \Box \Box \Diamond P$ ovat prefiksoituja lauseita.
- σn on prefiksi, joka saadaan prefiksistä σ liittämällä sen perään luku n . Esim. jos $\sigma = \langle 1 \rangle$, $\sigma 11 = \langle 1, 11 \rangle$.
- Prefiksi muotoa σn on **K-saavutettavissa** prefiksistä σ . Esim. $\langle 1, 11, 11 \rangle$ on **K-saavutettavissa** prefiksistä $\langle 1, 11 \rangle$.

Esimerkki.

$$\begin{array}{l} 1. \langle 3, 2, 1 \rangle \neg ((\neg P \rightarrow Q) \rightarrow P) \\ 2. \langle 3, 2, 1 \rangle (\neg P \rightarrow Q) \quad (1) \\ 3. \langle 3, 2, 1 \rangle \neg P \quad (1) \\ 4. \langle 3, 2, 1 \rangle \neg \neg P \quad (2) \quad 5. \langle 3, 2, 1 \rangle Q \quad (2) \\ 6. \langle 3, 2, 1 \rangle P \quad (4) \\ \quad \times \end{array}$$

Modaalisäännöt

Määritelmä. Prefiksi on haarassa

- (i) **tarjolla**, jos se esiintyy haarassa,
- (ii) **rajoittamaton**, jos ei ole minkään haarassa esiintyvän prefiksin alkuosa.

Esim. Prefiksi $\langle 1, 1 \rangle$ on prefiksien $\langle 1, 1, 12, 3 \rangle$ ja $\langle 1, 1 \rangle$ alkuosa.

- **Modaalisäännöt**

$$\boxed{\square}\text{-sääntö:} \quad \frac{\sigma \square P}{\sigma n P}$$

mille tahansa tarjolla olevalle prefiksille σn .

$$\neg \boxed{\square}\text{-sääntö:} \quad \frac{\sigma \neg \square P}{\sigma n \neg P}$$

rajoittamattomalle prefiksille σn .

Taulutodistus

Määritelmä.

- Taulun haara on **suljettu**, jos se sisältää sekä σP että $\sigma \neg P$ jollekin lauseelle P ja prefiksille σ tai jos se sisältää lauseen $\sigma \perp$ tai lauseen $\sigma \neg \top$.
- Taulu on suljettu, jos jokainen sen haara on suljettu.
- Lauseen P **todistus** on taulu, jonka juurena on $\langle 1 \rangle \neg P$ ja joka on suljettu.

Esimerkki. 1. $\langle 1 \rangle \neg (\square P \rightarrow \square \square P)$

2. $\langle 1 \rangle \square P$ (1)

3. $\langle 1 \rangle \neg \square \square P$ (1)

4. $\langle 1, 1 \rangle \neg \square P$ (3)

5. $\langle 1, 1 \rangle P$ (2)

6. $\langle 1, 1, 1 \rangle \neg P$ (4)

7. $\langle 1, 2 \rangle \neg \square P$ (3)

8. $\langle 1, 2, 3 \rangle \neg P$ (7)

5. $\langle 1, 2 \rangle P$ (2)

⋮

Esimerkki. Lauseen $\square(P \wedge Q) \rightarrow (\square P \wedge \square Q)$ taulutodistus.

1. $\langle 1 \rangle \neg (\square(P \wedge Q) \rightarrow (\square P \wedge \square Q))$

2. $\langle 1 \rangle \square(P \wedge Q)$ (1)

3. $\langle 1 \rangle \neg (\square P \wedge \square Q)$ (1)

4. $\langle 1 \rangle \neg \square P$ (3) | 5. $\langle 1 \rangle \neg \square Q$ (3)

6. $\langle 1, 2 \rangle \neg P$ (4) | 9. $\langle 1, 3 \rangle \neg Q$ (5)

7. $\langle 1, 2 \rangle P \wedge Q$ (2) | 10. $\langle 1, 3 \rangle P \wedge Q$ (2)

8. $\langle 1, 2 \rangle P$ (7) | 11. $\langle 1, 3 \rangle Q$ (10)

×

×



Virheettömyys (soundius)

Teoreema. Jos lauseelle P löytyy todistus, lause P on **K**-pätevä.

Todistus. (Seuraavien osatulosten avulla)

- Määritellään taululle **K**-toteutuus: taulu on **K**-toteutuva, jos sen jokin haara "vastaa" mallia.
- Osoitetaan, että (i) **K**-toteutuva taulu ei voi sulkeutua, (ii) jos P ei ole **K**-pätevä, taulu $\langle 1 \rangle \neg P$ on **K**-toteutuva, (iii) jokainen sääntö säilyttää **K**-toteutuvuuden: jos taulu on **K**-toteutuva ennen säännön soveltamista, se on **K**-toteutuva myös säännön soveltamisen jälkeen.

Tällöin jos P ei ole **K**-pätevä, lauseen $\langle 1 \rangle \neg P$ taulu säilyy avoimena.

\Rightarrow Jos taulu lauseelle $\langle 1 \rangle \neg P$ on suljettu, lause P on **K**-pätevä.



(iii) Olkoon taulu Γ **K**-toteutuva.

Taulussa Γ on haara, jonka lauseet Σ ovat **K**-toteutuvia mallilla $\mathcal{M} = \langle S, R, v \rangle$ ja kuvauksella \mathcal{N} .

Osoitetaan, että kun sovelletaan mitä tahansa taulusääntöä, näin saatava taulu Γ' on myös **K**-toteutuva.

Sovelletaan taulusääntöä **K**-toteutuvaan haaraan Σ

$$\bullet \frac{\sigma\beta}{\sigma\beta_1 \mid \sigma\beta_2}$$

Tällöin taulussa Γ' haarat, joiden lausejoukot

$$\Sigma_1 = \Sigma \cup \{\sigma\beta_1\} \text{ ja } \Sigma_2 = \Sigma \cup \{\sigma\beta_2\}$$

Koska $\sigma\beta \in \Sigma$, $\mathcal{M}, \mathcal{N}(\sigma) \Vdash \beta$, joten $\mathcal{M}, \mathcal{N}(\sigma) \Vdash \beta_1$ tai

$\mathcal{M}, \mathcal{N}(\sigma) \Vdash \beta_2$.

$\Rightarrow \Gamma'$ **K**-toteutuva.



Määritelmä. Taulu on **K**-toteutuva, jos joku sen haaroista on **K**-toteutuva.

Taulun haara on **K**-toteutuva, jos haarassa esiintyvien prefiksoitujen lauseiden joukko on **K**-toteutuva.

Prefiksoitujen lauseiden joukko Σ on **K**-toteutuva, jos löytyy malli $\mathcal{M} = \langle S, R, v \rangle$ ja kuvaus $\mathcal{N} : \Sigma$:ssa esiintyvistä prefikseistä joukolle S s.e.

1. Jos prefiksit σ ja τ esiintyvät joukossa Σ ja τ on **K**-saavutettavissa prefiksistä σ , tällöin $\mathcal{N}(\sigma)R\mathcal{N}(\tau)$.
2. Jos $\sigma P \in \Sigma$, niin $\mathcal{M}, \mathcal{N}(\sigma) \Vdash P$.

\Rightarrow (i) **K**-toteutuva taulu ei voi sulkeutua.

\Rightarrow (ii) Jos lause P ei ole **K**-pätevä, taulu $\langle 1 \rangle \neg P$ on **K**-toteutuva.

Näin on, koska lauseella $\neg P$ on malli $\mathcal{M} = \langle S, R, v \rangle$, jolle $\mathcal{M}, s' \Vdash \neg P$.

Tällöin haara $\{\langle 1 \rangle \neg P\}$ on **K**-toteutuva kuvauksella $\mathcal{N}(\langle 1 \rangle) = s'$.



$$\bullet \frac{\sigma\alpha}{\sigma\alpha_1 \quad \sigma\alpha_2} \quad \text{Samaan tapaan.}$$

$$\bullet \frac{\sigma \Box P}{\sigma n P} \quad \text{tarjolla olevalle prefiksille } \sigma n.$$

Tällöin taulussa Γ' haara, jonka lausejoukko $\Sigma_1 = \Sigma \cup \{\sigma n P\}$.

Koska $\sigma \Box P \in \Sigma$, $\mathcal{M}, \mathcal{N}(\sigma) \Vdash \Box P$, joten kaikille t , $\mathcal{N}(\sigma)Rt$,

$\mathcal{M}, t \Vdash P$.

Koska σn on **K**-saavutettavissa σ :sta, $\mathcal{N}(\sigma)R\mathcal{N}(\sigma n)$. Siis

$\mathcal{M}, \mathcal{N}(\sigma n) \Vdash P$.

$\Rightarrow \Gamma'$ **K**-toteutuva.

- $\frac{\sigma \neg \Box P}{\sigma n \neg P}$ rajoittamattomalle prefiksille σn .

Tällöin taulussa Γ' haara, jonka lausejoukko $\Sigma_1 = \Sigma \cup \{\sigma n \neg P\}$.

Koska $\sigma \neg \Box P \in \Sigma$, $\mathcal{M}, \mathcal{N}(\sigma) \Vdash \neg \Box P$, joten on olemassa t , $\mathcal{N}(\sigma)Rt$, $\mathcal{M}, t \Vdash \neg P$.

Koska σn ei ole mikään Σ prefiksin alkuosa, kuvausta \mathcal{N} voidaan laajentaa: $\mathcal{N}(\sigma n) = t$. Tällöin $\mathcal{M}, \mathcal{N}(\sigma n) \Vdash \neg P$.

$\Rightarrow \Gamma'$ **K-toteutuva**. ■

Systemaattinen **K**-taulu lauseelle P :

1. Taulun juureksi $\langle 1 \rangle \neg P$.
 2. WHILE taulu ei suljettu eikä kaikkia lauseita merkitty käytetyiksi DO BEGIN
 - 2.1 Valitaan taulusta ylin käyttämätön solmu σQ .
 - 2.2 Jos Q ei literaali, jokaiselle avoimelle σQ kautta kulkevalle haaralle θ :
 - Jos σQ muotoa $\sigma \alpha$, lisätään haaran θ loppuun ensin $\sigma \alpha_1$ ja sitten $\sigma \alpha_2$.
 - Jos σQ on muotoa $\sigma \beta$, lisätään θ :n loppuun kaksi lapsisolmua $\sigma \beta_1$ ja $\sigma \beta_2$ (haarautuminen).
 - Jos σQ on muotoa $\sigma \neg \Box P$, lisätään haaran θ loppuun solmu $\sigma n \neg P$ jollekin tässä haarassa rajoittamattomalle σn .
 - Jos σQ on muotoa $\sigma \Box P$, kaikille tässä haarassa tarjolla oleville σn lisätään haaran θ loppuun solmu $\sigma n P$ sekä **lisäksi solmu $\sigma \Box P$** .
 - 2.3 Merkitään σQ käytetyksi.
- END.

Täydellisyys

Miten taata, että jokaiselle pätevälle lauseelle löytyy taulutodistus, kun taulun haarat voivat olla äärettömiä? Milloin sääntöjä on sovellettu riittävästi/reilusti?

\Rightarrow Taulun rakentamiseen tarvitaan systemaattinen menetelmä, jossa kaikkia sääntöjä on käytetty riittävästi eli jokaiselle avoimelle haaralle θ pätee:

- (i) Jos $\sigma \neg \neg P \in \theta$, tällöin $\sigma P \in \theta$.
- (ii) Jos $\sigma \beta \in \theta$, tällöin $\sigma \beta_1 \in \theta$ tai $\sigma \beta_2 \in \theta$.
- (iii) Jos $\sigma \alpha \in \theta$, tällöin $\sigma \alpha_1 \in \theta$ ja $\sigma \alpha_2 \in \theta$.
- (iv) Jos $\sigma \neg \Box Q \in \theta$, $\sigma n \neg Q \in \theta$, jollakin n .
- (v) Jos $\sigma \Box Q \in \theta$, $\sigma n Q \in \theta$ kaikilla σn , jotka tarjolla θ :ssa.

Huom! Systemaattinen menetelmä takaa täydellisyys mutta voi sallia äärettömät taulut, jos ei todistettava lause ole pätevä.

Ratkaisumenetelmä takaa, että taulun rakentaminen päättyy äärellisellä askelmäärällä, olipa todistettava lause pätevä tai ei.

Teoreema. (Täydellisyys) Jos P on **K**-pätevä, lauseen P systemaattinen **K**-taulu sulkeutuu.

Todistus. Osoitetaan, että jos lauseen P systemaattisessa **K**-taulussa on avoin haara, P ei ole **K**-pätevä.

Olkoon θ valmiin systemaattisen taulun avoin haara ja olkoon

$\mathcal{M} = \langle S, R, v \rangle$ seuraava malli (**vastamalli**).

1. S on θ :ssa esiintyvien prefiksien joukko.
2. $\sigma R \tau$ joss τ on **K**-saavutettavissa σ :sta.
3. $v(\sigma, Q) = \text{true}$ joss σQ esiintyy θ :ssa atomilauseelle Q .

Teoreema seuraa seuraavasta tuloksesta: jos $\sigma Q \in \theta$, niin $\mathcal{M}, \sigma \Vdash Q$.

(Tällöin koska $\langle 1 \rangle \neg P$ jokaisessa haarassa, $\mathcal{M}, \langle 1 \rangle \Vdash \neg P$, joten P ei ole **K**-pätevä).



Todistetaan induktiolla lauseen Q pituuden suhteen:

jos $\sigma Q \in \theta$, $\mathcal{M}, \sigma \Vdash Q$.

- (literaali) Jos Q on atomilause ja $\sigma Q \in \theta$, niin $v(\sigma, Q) = \text{true}$ ja $\mathcal{M}, \sigma \Vdash Q$.
Jos $\sigma \neg Q \in \theta$, Q on atomilause ja $\sigma Q \notin \theta$. Tällöin $\mathcal{M}, \sigma \not\Vdash Q$ ja $\mathcal{M}, \sigma \Vdash \neg Q$.

Induktiohypoteesi: Jos Q on lyhyempi kuin j ja $\sigma Q \in \theta$, tällöin $\mathcal{M}, \sigma \Vdash Q$.

Olkoon lauseen Q pituus j . Nyt Q on jokin seuraavista:

- (Muotoa $\neg\neg Q$) Jos $\sigma \neg\neg Q \in \theta$, tällöin $\sigma Q \in \theta$. [IH] $\mathcal{M}, \sigma \Vdash Q$.
Täten $\mathcal{M}, \sigma \Vdash \neg\neg Q$.



Ratkaisuproseduuri (lauseen P **K**-pätevyydelle):

1. Taulun juureksi $\langle 1 \rangle \neg P$.
 2. WHILE taulu ei suljettu eikä kaikkia lauseita merkitty käytetyiksi DO BEGIN
 - 2.1 Valitaan taulusta ylin käyttämätön solmu σQ .
 - 2.2 Jos Q ei ole literaali, jokaiselle haaralle θ , joka kulkee σQ kautta:
 - Jos σQ on muotoa $\sigma\alpha$, lisätään haaran θ loppuun ensin $\sigma\alpha_1$ ja sitten $\sigma\alpha_2$.
 - Jos σQ on muotoa $\sigma\beta$, lisätään θ :n loppuun kaksi lapsisolmua $\sigma\beta_1$ ja $\sigma\beta_2$.
 - Jos σQ on muotoa $\sigma\neg\square P$ lisätään haaran θ loppuun solmu $\sigma n \neg P$ jollekin tässä haarassa rajoittamattomalle σn sekä tämän jälkeen $\sigma n X$ kullekin haarassa esiintyvälle $\sigma\square X$.
 - Jos σQ on muotoa $\sigma\square P$, kaikille tässä haarassa tarjolla oleville σn lisätään haaran θ loppuun solmu $\sigma n P$.
 - 2.3 Merkitään σQ käytetyksi.
- END.



- (β -lause) Jos $\sigma\beta \in \theta$, tällöin $\sigma\beta_1 \in \theta$ tai $\sigma\beta_2 \in \theta$.
[IH] $\mathcal{M}, \sigma \Vdash \beta_1$ tai $\mathcal{M}, \sigma \Vdash \beta_2$. Tätten $\mathcal{M}, \sigma \Vdash \beta$.
- (α -lause) Jos $\sigma\alpha \in \theta$, tällöin $\sigma\alpha_1 \in \theta$ ja $\sigma\alpha_2 \in \theta$.
[IH] $\mathcal{M}, \sigma \Vdash \alpha_1$ ja $\mathcal{M}, \sigma \Vdash \alpha_2$. Tätten $\mathcal{M}, \sigma \Vdash \alpha$.
- (Muotoa $\neg\square Q$) Jos $\sigma\neg\square Q \in \theta$, $\sigma n \neg Q \in \theta$.
[IH] $\mathcal{M}, \sigma n \Vdash \neg Q$. Siis $\mathcal{M}, \sigma \not\Vdash \square Q$, koska $\sigma R \sigma n$.
- (Muotoa $\square Q$) Jos $\sigma\square Q \in \theta$, $\sigma n Q \in \theta$ kaikilla σn , jotka tarjolla θ :ssa.
[IH] $\mathcal{M}, \sigma n \Vdash Q$. Tätten $\mathcal{M}, \sigma \Vdash \square Q$.

Siis jokaiselle avoimelle haaralle θ :

jos $\sigma Q \in \theta$, niin $\mathcal{M}, \sigma \Vdash Q$. ■



Esimerkki. Tutkitaan taulumenetelmällä, onko

$\square P \rightarrow \square\square P$ **K**-pätevä.

Rakennetaan **K**-taulu ratkaisuproseduurilla.

1. $\langle 1 \rangle \neg(\square P \rightarrow \square\square P)$
2. $\langle 1 \rangle \square P$ (1)
3. $\langle 1 \rangle \neg \square\square P$ (1)
4. $\langle 1, 2 \rangle \neg \square P$ (3)
5. $\langle 1, 2 \rangle P$ (2/3)
6. $\langle 1, 2, 3 \rangle \neg P$ (4)

Koska taulu jää auki, voidaan avoimesta haarasta koota *vastamalli*

$\mathcal{M} = \langle S, R, v \rangle$, missä $S = \{ \langle 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 2, 3 \rangle \}$

$R = \{ \langle \langle 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle \rangle, \langle \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 2, 3 \rangle \rangle \}$ ja $v(\sigma, P) = \text{true}$ joss $\sigma = \langle 1, 2 \rangle$.

Nyt $\mathcal{M}, \langle 1 \rangle \not\Vdash \square P \rightarrow \square\square P$.

Muut modaalilogiikat

Laajennetaan edellä esitetty taulumenetelmä käsittelemään myös muita modaalilogiikoita kuin **K**.

Määritelmä. Prefiksi τ on prefiksin σ yksinkertainen jatko, jos τ on muotoa σn jollekin n .

Taulumenetelmä modaalilogiikalle **L**:

$\neg\Box$ -sääntö:

$$\frac{\sigma\neg\Box P}{\tau\neg P} \qquad \frac{\sigma\Diamond P}{\tau P}$$

missä τ on haarassa rajoittamaton prefiksin σ yksinkertainen jatko.

Määritelmä. Prefiksien saavutettavuusrelaatio:

1. yleinen, jos σn on saavutettavissa prefiksistä σ kaikilla n ;
2. käänteinen, jos σ on saavutettavissa prefiksistä σn kaikilla n ;
3. refleksiivinen, jos σ on saavutettavissa σ :sta;
4. transitiivinen, jos τ on saavutettavissa prefiksistä σ aina, kun σ on τ :n aito alkuosa.
5. universaalinen, jos prefiksi on saavutettavissa mistä tahansa prefiksistä.

\Box -sääntö:

$$\frac{\sigma\Box P}{\tau P} \qquad \frac{\sigma\neg\Diamond P}{\tau\neg P}$$

missä τ **L**-saavutettavissa prefiksistä σ ja

1. logiikoille **K, KB, K4**
 τ on tarjolla haarassa;
2. logiikoille **D, T, DB, B, D4, S4, S5**
 - (i) τ on tarjolla haarassa tai
 - (ii) τ on rajoittamaton prefiksin σ yksinkertainen jatko.

Logiikka L	L -saavutettavuus
K, D	yleinen
T	yleinen, refleksiivinen
KB, DB	yleinen, käänteinen
B	yleinen, refleksiivinen, käänteinen
K4, D4	yleinen, transitiivinen
S4	yleinen, refleksiivinen, transitiivinen
S5	universaali

Esimerkkejä

D-taulutodistus lauseelle $\Box P \rightarrow \neg\Box\neg P$.

1. $\langle 1 \rangle \neg(\Box P \rightarrow \neg\Box\neg P)$
2. $\langle 1 \rangle \Box P$ (1)
3. $\langle 1 \rangle \neg\neg\Box\neg P$ (1)
4. $\langle 1 \rangle \Box\neg P$ (3)
5. $\langle 1, 2 \rangle \neg P$ (4) Huom. 2.(ii)
6. $\langle 1, 2 \rangle P$ (2)

×

K4-taulutodistus lauseelle $\Box P \rightarrow \Box\Box P$.

1. $\langle 1 \rangle \neg(\Box P \rightarrow \Box\Box P)$
2. $\langle 1 \rangle \Box P$ (1)
3. $\langle 1 \rangle \neg\Box\Box P$ (1)
4. $\langle 1, 2 \rangle \neg\Box P$ (3)
5. $\langle 1, 2, 3 \rangle \neg P$ (4)
6. $\langle 1, 2, 3 \rangle P$ (2) Huom. transit.

×

T-taulutodistus lauseelle $\Box P \rightarrow P$.

1. $\langle 1 \rangle \neg(\Box P \rightarrow P)$
2. $\langle 1 \rangle \Box P$ (1)
3. $\langle 1 \rangle \neg P$ (1)
4. $\langle 1 \rangle P$ (2) Huom. refleksiivisyys

×

KB-taulutodistus lauseelle $P \rightarrow \Box\Diamond P$.

1. $\langle 1 \rangle \neg(P \rightarrow \Box\Diamond P)$
2. $\langle 1 \rangle P$ (1)
3. $\langle 1 \rangle \neg\Box\Diamond P$ (1)
4. $\langle 1, 2 \rangle \neg\Diamond P$ (3)
5. $\langle 1 \rangle \neg P$ (4) Huom. käänteisyys

×

Systemaattinen L-taulu lauseelle P

Kuten logiikalle K, mutta kohta 2.2 tarkennettuna:

2.2 Jos Q ei literaali, jokaiselle σQ kautta kulkevalle avoimelle haaralle θ :

- Jos σQ on muotoa $\sigma \neg \Box P$ ($\sigma \Diamond P$), lisätään haaran θ loppuun solmu $\sigma n \neg P$ ($\sigma n P$) jollekin tässä haarassa rajoittamattomalle σn .
- Jos σQ on muotoa $\sigma \Box P$ ($\sigma \neg \Diamond P$),
(a) kun L on K, KB, K4, T, B, S4, S5:
 jokaiselle θ :ssa tarjolla olevalle σ' , joka on L-saavutettavissa σ :sta, lisätään θ :n loppuun solmu $\sigma' P$ ($\sigma' \neg P$) ja lopuksi $\sigma \Box P$ ($\sigma \neg \Diamond P$).
(b) kun L on D, DB, D4:
 jokaiselle θ :ssa tarjolla olevalle σ' , joka on L-saavutettavissa σ :sta, lisätään θ :n loppuun solmu $\sigma' P$ ($\sigma' \neg P$). Jos tällaisia prefiksejä σ' ei ole, lisätään θ :n loppuun solmu $\sigma n P$ ($\sigma n \neg P$) jollekin tässä haarassa rajoittamattomalle σn . Kummassakin tapauksessa lisätään vielä haaran loppuun $\sigma \Box P$ ($\sigma \neg \Diamond P$).

Esimerkki. S5-taulutodistus lauseelle

$$\neg \Box P \rightarrow \Box \neg \Box P.$$

1. $1 \neg(\neg \Box P \rightarrow \Box \neg \Box P)$
2. $1 \neg \Box P$ (1)
3. $1 \neg \Box \neg \Box P$ (1)
4. $2 \neg P$ (2)
5. $3 \neg \neg \Box P$ (3)
6. $3 \Box P$ (5)
7. $2 P$ (6)

×

S5-taulut

Prefikseinä riittävät luonnolliset luvut.

$$\neg \Box\text{-sääntö:} \quad \frac{n \neg \Box P}{k \neg P} \qquad \frac{n \Diamond P}{k P}$$

missä k ei esiinny haarassa.

$$\Box\text{-sääntö:} \quad \frac{n \Box P}{k P} \qquad \frac{n \neg \Diamond P}{k \neg P}$$

mille tahansa k.

Systemaattinen menetelmä (S5-pätevyydelle):

1. Taulun juureksi $1 \neg P$.

2. WHILE taulu ei suljettu eikä kaikkia lauseita merkitty käytetyiksi DO BEGIN

2.1 Valitaan taulusta ylin käyttämätön solmu nQ .

2.2 Jos Q ei ole literaali, jokaiselle avoimelle haaralle θ , joka kulkee nQ kautta:

- Jos nQ muotoa $n\alpha$, lisätään haaran θ loppuun ensin $n\alpha_1$ ja sitten $n\alpha_2$.
- Jos nQ on muotoa $n\beta$, lisätään θ :n loppuun kaksi lapsisolmua $n\beta_1$ ja $n\beta_2$.
- Jos nQ on muotoa $n \neg \Box P$, lisätään haaran θ loppuun solmu $k \neg P$ jollekin tässä haarassa rajoittamattomalle k sekä tämän jälkeen kX kullekin haarassa esiintyvälle $j \Box X$.
- Jos nQ on muotoa $n \Box P$, kaikille tässä haarassa tarjolla oleville k lisätään haaran θ loppuun solmu kP .

2.3 Merkitään nQ käytetyiksi.

END.

KD45-taulut

Prefikseinä riittävät luonnolliset luvut.

$$\neg\Box\text{-sääntö:} \quad \frac{n\neg\Box P}{k\neg P} \qquad \frac{n\Diamond P}{kP}$$

missä k ei esiinny haarassa.

$$\Box\text{-sääntö:} \quad \frac{n\Box P}{kP} \qquad \frac{n\neg\Diamond P}{k\neg P}$$

mille tahansa $k \neq 1$.

Looginen seuraavuus

Tehtävä: $\Sigma \models_{\mathbf{L}} Y \implies P$

Taulumenetelmä: asetetaan taulun juureksi $\langle 1 \rangle \neg P$ ja käytetään taulun rakentamiseen \mathbf{L} -logiikan mukaisia taulusääntöjä, joiden lisäksi voidaan käyttää kahta uutta sääntöä premissille:

Globaali sääntö: solmulla σQ voidaan jatkaa mitä tahansa haaraa mille tahansa haarassa tarjolla olevalla prefiksillä σ ja mille tahansa globaalille premissille $Q \in \Sigma$.

Lokaali sääntö: solmulla $\langle 1 \rangle Q$ voidaan jatkaa mitä tahansa haaraa mille tahansa lokaalille premissille $Q \in Y$.

Esimerkki. Vertaa.

$$\begin{aligned} (\Box P \rightarrow P): & 1. \quad 1\neg(\Box P \rightarrow P) \\ & 2. \quad 1\Box P \quad (1) \\ & 3. \quad 1\neg P \quad (1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Box(\Box P \rightarrow P): & 1. \quad 1\neg\Box(\Box P \rightarrow P) \\ & 2. \quad 2\neg(\Box P \rightarrow P) \quad (1) \\ & 3. \quad 2\Box P \quad (2) \\ & 4. \quad 2\neg P \quad (2) \\ & 5. \quad 2P \quad (3) \end{aligned}$$

×

Esimerkki. $\{P\} \models_{\mathbf{K}} \{\Box P \rightarrow Q\} \implies Q$:

$$\begin{array}{l|l} 1. \quad \langle 1 \rangle \neg Q & \\ 2. \quad \langle 1 \rangle \Box P \rightarrow Q \quad (\text{LP}) & \\ 3. \quad \langle 1 \rangle \neg \Box P \quad (2) & 4. \quad \langle 1 \rangle Q \quad (2) \\ 5. \quad \langle 1, 2 \rangle \neg P \quad (2) & \quad \times \\ 6. \quad \langle 1, 2 \rangle P \quad (\text{GP}) & \\ & \times \end{array}$$