

T-79.146

Kevät 2004

Logiikka tietotekniikassa: erityiskysymyksiä I

Laskuharjoitus 10

Ratkaisut

1.

$\mathcal{M}, x \models P \mathbf{U} Q$, joss on olemassa i siten, että $\mathcal{M}, x^i \models Q$ ja kaikille $j < i$ pätee $\mathcal{M}, x^j \models P$

$\mathcal{M}, x \models \top \mathbf{U} P$, joss on olemassa i siten, että $\mathcal{M}, x^i \models P$ ja kaikille $j < i$ pätee $\mathcal{M}, x^j \models \top$

$\mathcal{M}, x \models \mathbf{F} P$, joss on olemassa i siten, että $\mathcal{M}, x^i \models P$

$\mathcal{M}, x \models \mathbf{F} \neg P$, joss on olemassa i siten, että $\mathcal{M}, x^i \models \neg P$

$\mathcal{M}, x \not\models \mathbf{F} \neg P$, joss kaikille i pätee $\mathcal{M}, x^i \not\models \neg P$

$\mathcal{M}, x \models \neg \mathbf{F} \neg P$, joss kaikille i pätee $\mathcal{M}, x^i \not\models \neg P$

$\mathcal{M}, x \models \mathbf{G} P$, joss kaikille i pätee $\mathcal{M}, x^i \models P$

$\mathcal{M}, x \models P \mathbf{U} Q$, joss on olemassa i siten, että $\mathcal{M}, x^i \models Q$ ja kaikille $j < i$ pätee $\mathcal{M}, x^j \models P$


$\mathcal{M}, x \models (\neg P) \mathbf{U} (\neg Q)$, joss on olemassa i siten, että $\mathcal{M}, x^i \models \neg Q$ ja kaikille $j < i$ pätee $\mathcal{M}, x^j \models \neg P$

$\mathcal{M}, x \not\models (\neg P) \mathbf{U} (\neg Q)$, joss kaikille i : joko $\mathcal{M}, x^i \not\models \neg Q$, tai on olemassa $j < i$ siten, että $\mathcal{M}, x^j \not\models \neg P$

$\mathcal{M}, x \models \neg ((\neg P) \mathbf{U} (\neg Q))$, joss kaikille i : jos $\mathcal{M}, x^i \models \neg Q$, niin silloin on olemassa $j < i$ siten, että $\mathcal{M}, x^j \not\models \neg P$

$\mathcal{M}, x \models P \mathbf{R} Q$, joss kaikille i : jos $\mathcal{M}, x^i \not\models Q$, niin silloin on olemassa $j < i$ siten, että $\mathcal{M}, x^j \models P$


2. a) $\mathcal{M} = \langle S, R, v \rangle$, missä $S = \{s, t\}$, $R = \{\langle s, t \rangle, \langle t, t \rangle\}$, $v(s, P) = \text{true}$ ja $v(t, P) = \text{false}$.



$\mathcal{M}, s \models \mathbf{AF}P$ pätee, koska (s, t, t, t, \dots) on ainoa s :stä alkava täysi polku, ja tällä polulla on tila s , jolle pätee $\mathcal{M}, s \models P$. Siten $\mathbf{AF}P$ on toteutuva.

Jotta $\mathbf{GF}P$ toteutuisi mallissa \mathcal{M} , tulisi mallissa silloin olla olemassa täysi polku x , jolle $\mathcal{M}, x \models \mathbf{GF}P$, jolloin $\mathcal{M}, x^i \models FP$ päätisi kaikille $i \geq 0$, eli kaikille $i \geq 0$ olisi olemassa $j \geq i$ siten, että $\mathcal{M}, x^j \models P$. Toisin sanoen P :n pitäisi toteutua polun x ääretömän monessa (äärettömässä) loppuosassa. Tällaisia polkuja ei kuitenkaan ole, sillä \mathcal{M} :n ainoat täydet polut ovat (s, t, t, t, \dots) ja (t, t, t, \dots) , ja P pätee ainoastaan äärellisen monessa näiden polkujen äärettömässä loppuosassa. Lause $\mathbf{GF}P$ ei siis ole toteutuva mallissa \mathcal{M} .


- b) $\mathcal{M} = \langle S, R, v \rangle$, missä $S = \{s, t\}$, $R = \{\langle s, s \rangle, \langle s, t \rangle, \langle t, t \rangle\}$, $v(s, P) = \text{false}$ ja $v(t, P) = \text{true}$.



$\mathcal{M}, s \models \mathbf{EFAG}P$ ja $\mathcal{M}, t \models \mathbf{EFAG}P$ pätevät, koska malli sisältää täydet polut (s, t, t, t, \dots) ja (t, t, t, \dots) , joka kulkevat tilan t kautta, jolle selvästi pätee $\mathcal{M}, t \models \mathbf{AG}P$. Lause $\mathbf{EFAG}P$ on siis pätevä mallissa.

Lause $\mathbf{FG}P$ ei kuitenkaan ole pätevä mallissa, sillä täydellä polulla (s, s, s, \dots) ei ole ääretöntä loppuosaa x siten, että $\mathcal{M}, x^i \models P$ päätisi kaikille i (koska $v(s, P) = \text{false}$), jolloin siis $\mathcal{M}, (s, s, s, \dots) \not\models \mathbf{FG}P$.

- c) $\mathcal{M} = \langle S, R, v \rangle$, missä $S = \{s, t\}$, $R = \{\langle s, s \rangle, \langle s, t \rangle, \langle t, s \rangle, \langle t, t \rangle\}$, $v(s, P) = \text{true}$ ja $v(t, P) = \text{false}$.



Lause $\mathbf{FX}P$ on toteutuva, sillä mallissa on (esim.) täysi polku $x = (t, s, s, s, \dots)$, jolle $\mathcal{M}, x \models \mathbf{XP}$ (koska $v(s, P) = \text{true}$), ja siten $\mathcal{M}, x \models \mathbf{FX}P$.

Lause $\mathbf{EFAX}P$ ei kuitenkaan ole toteutuva missään mallin tilassa: jos lause toteutuisi, olisi mallissa olemassa tilasta s tai t lähtevä tilojen s ja t kautta kulkeva täysi polku, joka kulkisi lauseen $\mathbf{AX}P$ toteuttavan tilan kautta. Tulisi siis olla joko $\mathcal{M}, s \models \mathbf{AX}P$ tai $\mathcal{M}, t \models \mathbf{AX}P$; kumpikaan näistä ei kuitenkaan toteudu, sillä sekä s:llä että t :llä on R -relaatiossa seuraaja t , jolle $\mathcal{M}, t \not\models P$.

3. a) $\mathcal{M} = \langle S, R, v \rangle$, missä $S = \{s, t\}$, $R = \{\langle s, t \rangle, \langle t, s \rangle\}$, $v(s, P) = v(s, V) = \text{false}$ ja $v(t, P) = v(t, V) = \text{true}$.



Tästä mallista voidaan erottaa täydet polut $x_1 = (s, t, s, t, \dots)$ ja $x_2 = (t, s, t, s, \dots)$.

- $\mathcal{M}, s \models \mathbf{E}(\neg V \mathbf{U} P)$ pätee, sillä $\mathcal{M}, x_1^1 \models P$ (koska $v(t, P) = \text{true}$), ja kaikille $i < 1$ pätee $\mathcal{M}, x_1^i \models \neg V$. Myös $\mathcal{M}, t \models \mathbf{E}(\neg V \mathbf{U} P)$ pätee, sillä x_2 on t :stä lähtevä täysi polku, ja $\mathcal{M}, x_2^0 \models P$.
- Koska $\mathcal{M}, x_1^0 \models \neg P$, niin $\mathcal{M}, s \models \mathbf{E}(V \mathbf{U} \neg P)$ pätee. Vasemmastaan $\mathcal{M}, t \models \mathbf{E}(V \mathbf{U} \neg P)$ pätee, koska $\mathcal{M}, x_2^1 \models \neg P$, ja $\mathcal{M}, x_2^i \models V$ kaikille $i < 1$.
- $\mathcal{M}, s \models \mathbf{AF}(V \rightarrow \mathbf{AX} \neg V) \wedge \mathbf{EF}V$, sillä x_1 on ainoa s :stä alkava täysi polku, ja $\mathcal{M}, x_1 \models \mathbf{F}(V \rightarrow \mathbf{AX} \neg V)$ (koska selvästi esim. $\mathcal{M}, x_1^0 \models V \rightarrow \mathbf{AX} \neg V$, koska $v(s, V) = \text{false}$) ja lisäksi $\mathcal{M}, x_1 \models \mathbf{F}V$, koska polku x_1 kulkee tilan t kautta, ja $v(t, V) = \text{true}$.

Samalla tavoin havaitaan, että $\mathcal{M}, t \models \mathbf{AF}(V \rightarrow \mathbf{AX} \neg V) \wedge \mathbf{EF}V$, sillä x_2 on ainoa t :stä alkava täysi polku, ja x_2 :lle pätee $\mathcal{M}, x_2^0 \models \mathbf{AX} \neg V$, koska $\mathcal{M}, t \models \mathbf{AX} \neg V$ (ainoa t :n seuraaja on s , ja $v(s, V) = \text{false}$). Myös $\mathcal{M}, t \models \mathbf{EF}V$ pätee, koska t :stä lähtevälle täydelle polulle x_2 pätee $\mathcal{M}, x_2^0 \models V$ (koska $v(t, V) = \text{true}$).

- b) $\mathcal{M} = \langle S, R, v \rangle$, missä $S = \{s, t\}$, $R = \{\langle s, t \rangle, \langle t, s \rangle\}$, $v(t, P) = v(s, V) = \text{false}$ ja $v(s, P) = v(t, V) = \text{true}$.



Mallista \mathcal{M} voidaan jälleen erottaa kaksi täyttä polkua $x_1 = (s, t, s, t, \dots)$ ja $x_2 = (t, s, t, s, \dots)$.

- $\mathcal{M}, s \models \mathbf{AG}(P \rightarrow \mathbf{F}V)$, sillä x_1 on ainoa s :stä alkava täysi polku, ja $\mathcal{M}, x_1 \models \mathbf{G}(P \rightarrow \mathbf{F}V)$. Tämä puolestaan seuraa siitä, että $\mathcal{M}, x_1^{2k} \models \mathbf{F}V$ (koska $\mathcal{M}, x_1^{2k+1} \models V$) kaikilla $k \geq 0$ sekä siitä, että $\mathcal{M}, x_1^{2k+1} \not\models P$ kaikilla $k \geq 0$.

Vastaavasti myös $\mathcal{M}, t \models \mathbf{AG}(P \rightarrow \mathbf{F}V)$ pätee, sillä x_2 on ainoa t :stä alkava täysi polku, ja $\mathcal{M}, x_2 \models \mathbf{G}(P \rightarrow \mathbf{F}V)$, koska $\mathcal{M}, x_2^{2k} \not\models P$ ja $\mathcal{M}, x_2^{2k+1} \models \mathbf{F}V$ kaikilla $k \geq 0$.

- $\mathcal{M}, s \models \mathbf{AF}(P \wedge \mathbf{F}(\neg P \wedge \mathbf{X}P))$, sillä x_1 on ainoa s :stä alkava täysi polku, ja $\mathcal{M}, x_1^0 \models P \wedge \mathbf{F}(\neg P \wedge \mathbf{X}P)$, koska $\mathcal{M}, x_1^0 \models P$ ($v(s, P) = \text{true}$) ja $\mathcal{M}, x_1^0 \models \mathbf{F}(\neg P \wedge \mathbf{X}P)$, sillä $\mathcal{M}, x_1^1 \models \neg P \wedge \mathbf{X}P$ (koska $v(t, P) = \text{false}$ ja $\mathcal{M}, (x_1^1)^1 \models P$).
Myös $\mathcal{M}, t \models \mathbf{AF}(P \wedge \mathbf{F}(\neg P \wedge \mathbf{X}P))$ on voimassa, sillä x_2 on ainoa t :stä lähtevä täysi polku, ja koska $x_2^1 = x_1 = x_1^0$ ja $\mathcal{M}, x_1^0 \models P \wedge \mathbf{F}(\neg P \wedge \mathbf{X}P)$ (ks. yllä), $\mathcal{M}, x_2 \models \mathbf{F}(P \wedge \mathbf{F}(\neg P \wedge \mathbf{X}P))$.
- $\mathcal{M}, s \models \mathbf{A}(\neg VUV)$, sillä x_1 on ainoa s :stä alkava täysi polku, ja $\mathcal{M}, x_1 \models \neg VUV$, koska $\mathcal{M}, x_1^1 \models V$ ($v(t, V) = \text{true}$) ja $\mathcal{M}, x_1^i \models \neg V$ kaikille $i < 1$ ($v(s, V) = \text{false}$).
Koska $v(t, V) = \text{true}$, $\mathcal{M}, x \models \neg VUV$ pätee kaikille t :stä alkaville täysille poluille x . Tästä seuraa, että $\mathcal{M}, t \models \mathbf{A}(\neg VUV)$ pätee.